

JUNIORlax®

www.juniorlax.de:

Erste Wahl für Informationen



Für Kindern von 2 – 11 Jahren:

Erste Wahl bei Verstopfung



Juniorlax® -6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. **Ein Beutel Juniorlax®** enthält folgende Wirkstoffe: Macrogol 3350 (Polyethylenglycol 3350) 6,563 g; Natriumchlorid 0,1754 g; Natriumhydrogencarbonat 0,0893 g; Kaliumchlorid 0,0233 g. **Anwendungsgebiet:** Zur Behandlung von chronischer Verstopfung bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren. **Warnhinweise:** Enthält Sorbitol. Packungsbeilage beachten. Zubereitete Lösung: Die trinkfertige Lösung kann maximal 3 Stunden bei Raumtemperatur (unter 25 °C) oder maximal 24 Stunden im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) aufbewahrt werden. Stand: 03.2018

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Spielerisch und hilfreich:
Das Juniorlax® Malheft



